



Mandarine : les variétés tardives

Citrus reticulata

- Plantes alimentaires
 - Fruits
 - Mandarines



Identité

Nom scientifique <i>Citrus reticulata</i>	Noms Kanak --
Famille Rutaceae	Autres noms communs --
Statut Biogéographique Plante exotique	
Origine géographique Asie	
Distribution géographique Nouvelle-Calédonie	

Description

Type de plante Arbre	Durée de vie Pluriannuelle
Feuillage Persistant	Hauteur à maturité Entre 2 et 5 m
Type de fruit alimentaire Agrume	Largeur à maturité Entre 2 et 5 m
Couleur du fruit Orange	Système racinaire Développé

Conduite culturale

Multiplication Bouturage, Greffage	Pollinisation --
Où planter ? Pleine terre, Extérieur	Croissance --
Type de sol Sol drainant	Entretien / Soins --
Densité	Exposition au soleil --
Productivité	Besoin en eau
	Résistance à la sécheresse

Santé

Résistance aux ravageurs
Résistance aux maladies
Principaux ravageurs --
Principales maladies --

Usage & vertus

Alimentation Jus de fruit, Produit frais
Vertus --
Autre usage Cosmétique et parfums, Médecine naturelle, Huiles essentielles

Saisonnalité

Floraison	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Fruits	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Taille	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



Généralités

Cette fiche présente les variétés de fin de saison ou tardives, afin de produire des mandarines après le pic de saison (de mai à juin) et ainsi étaler la production.

D'autres fiches présentent de façon plus détaillées des informations relatives aux mandarines :

Fiche : [Mandarine](#)

Fiche : [Les variétés précoces](#)

Fiche : [Les variétés de saison](#)

Fiche : [Installez votre verger d'agrumes](#)

Les variétés de fin de saison et tardives

Les 3 variétés tardives **les plus recommandées** pour leurs qualités agronomiques et économiques :

- **C54**
- **Cravo**
- **king of Siam**



Mandarines, trois variétés tardives ©IAC

Production locale

Les quantités produites et commercialisées en Nouvelle-Calédonie sont présentées dans le tableau ci-dessous.

à compléter

Saisonnalité

Floraison

- Septembre

Récolte

- **Juin à août**
- Pic de production : **juillet**

Caractéristiques de la variété C54

Fruit

- Taille : moyen
- Poids : **200 g**
- Forme : ronde à aplatie
- **Moins facile à éplucher**
- Nombre de graines par fruit en moyenne : 24
- Teneur en sucre : 8.5° brix
- Teneur de jus : **43%**
- Visiblement attractive
- Peu de fibres sur les carpelles
- Peu aromatique

Plantation

- 5 x 7 m
- Port mixte avec des charpentières espacées
- Supporte bien les vents

Saisonnalité

- Floraison : septembre
- Récolte : **juin à juillet**

Rendement et manutention

- Rendement élevé : **120 kg par arbre**
- Bonne tenue du fruit sur l'arbre
- Belle homogénéité de la récolte
- Bonne réaction à la manutention

Santé

- **Tolérante** aux cochenilles et acariens



Mandarine tardive, variété C54 ©IAC



Mandarine tardive, variété C54, arbre entier ©IAC

Caractéristiques de la variété CRAVO

Fruit

- Taille : moyen
- Poids : **170 g**
- Forme : ronde
- **Moins facile à éplucher**
- Nombre de graines par fruit en moyenne : 24
- Teneur en sucre : 9.2° brix
- Teneur de jus : **45%**
- Beaucoup de fibres sur les carpelles
- **Idéale pour les jus**

Plantation

- 5 x 7 m

Saisonnalité



- Floraison : septembre
- Récolte : **juin à août**

Rendement et manutention

- Rendement élevé : **120 kg par arbre**
- Très bonne tenue du fruit sur l'arbre
- Réaction moyenne à la manutention

Santé

- Sensible aux acariens



Mandarine tardive, variété Cravo ©IAC



Mandarine tardive, variété Cravo, arbre entier ©IAC

Caractéristiques de la variété KING OF SIAM

Fruit

- Taille : très gros
- Poids : **344 g**
- Forme : aplatie
- **Moins facile à éplucher**
- Nombre de graines par fruit en moyenne : 36
- Teneur en sucre : 8.2° brix
- Teneur de jus : 35%
- Peau épaisse

Plantation

- 4 x 7 m
- Port érigé
- Mieux adaptée aux saisons fraîches marquées

Saisonnalité

- Floraison : septembre
- Récolte : **juillet à août**

Rendement et manutention

- Rendement faible : **50 kg par arbre**
- Excellente tenue du fruit sur l'arbre
- Bonne réaction à la manutention

Santé

- Sensible aux acariens à la nouaison et au début du grossissement



Mandarine tardive, variété King of Siam

©IAC



Mandarine tardive, variété King of Siam, arbre entier ©IAC



Auteurs

Publié le : 6 août 2021

Auteurs du contenu scientifique et technique :

- Stéphane Lebégin (IAC)
- Arbofruits

Adaptation et rédaction web de la fiche Agripédia :

- Christina Do (IAC)
- Estelle Bonnet-Vidal (Lincks)

Relecture et validation finale : Stéphane Lebégin

Citation bibliographique recommandée :

Agripédia. Fiche technique "**Mandarine : les variétés tardives**" [En ligne] <https://www.agripedia.nc/ressource-s-vegetales/plantes-alimentaires/fruits/mandarines/mandarine-les-varietes-tardives> (consulté le jour/mois/année)

Voir également [FAQ "Comment citer cette référence bibliographique ?"](#)