



Avocat : les variétés de saison

Persea americana



- Plantes alimentaires
 - Fruits
 - Avocats

En Nouvelle-Calédonie, la saison des avocats bat son plein de mai et juin. Trois variétés présentent les meilleures qualités agronomiques pour produire en pleine saison.

Identité

Nom scientifique <i>Persea americana</i>	Noms Kanak --
Famille Lauraceae	Autres noms communs --
Statut Biogéographique Plante exotique	
Origine géographique Amérique centrale	
Distribution géographique Nouvelle-Calédonie	

Description

Type de plante Arbre	Durée de vie Pluriannuelle
Feuillage Persistant	Hauteur à maturité Plus de 5 m
Type de fruit alimentaire Fruit à noyau	Largeur à maturité Entre 2 et 5 m
Couleur du fruit Vert	Système racinaire Développé

Conduite culturale

Multiplication Greffage	Pollinisation Par le vent, Autopollinisation, Par les insectes
Où planter ? Pleine terre	
Type de sol Sol drainant	Croissance Lente
Densité 240 plant/Ha	Entretien / Soins Modéré
Productivité 100kg/arbre	Exposition au soleil Mi-ombre
	Besoin en eau
	Résistance à la sécheresse

Santé

Résistance aux ravageurs
Résistance aux maladies
Principaux ravageurs Punaise
Principales maladies Oïdium, Phytophthora

Usage & vertus

Alimentation Produit frais
Vertus Magnésium
Autre usage Huiles alimentaires

Saisonnalité

Floraison	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Fruits	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Taille	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



Généralités

Cette fiche présente les variétés les plus recommandées pour produire des avocats en pleine saison.

D'autres fiches présentent de façon plus détaillées des informations sur l'avocatier et sa culture :

Fiche : [Les avocats](#)

Fiche : [Installez votre verger d'avocats](#)

Les variétés de saison

Les trois variétés de saison **les plus recommandées** pour leurs qualités agronomiques et économiques :

- Hall
- Choquette
- Simpson



Avocats, trois variétés de saison ©IAC

Saisonnalité

Floraison

- De **juillet à septembre**, selon les variétés.

Récolte

- D'**avril à juillet**
- Pic de production : **mai et juin**.

Production locale

Les quantités produites et commercialisées en Nouvelle-Calédonie sont présentées dans le tableau ci-dessous

Caractéristiques de la variété HALL

Type

- Hybride Guatemala x Antilles
- Groupe A

Fruit

- Taille : moyen à gros
- Poids : de **500 à 700 g**
- Forme de poire à base est arrondie
- Le pédoncule s'insère obliquement
- Peau lisse
- Couleur : vert clair, luisante
- Chair : jaune foncé, onctueuse et goûteuse
- Teneur en huile : 10 à 16%
- Matière sèche : 13 à 16%

Plantation

- 7 x 9 m
- Tailler un an sur deux

Saisonnalité

- Floraison (groupe A) : août-septembre
- Récolte : mi-avril à mi-juin
- Ne vire pas de couleur à maturité

Rendement et manutention

- Rendement moyen : **27,5 kg par arbre**. Les variétés les plus productives atteignent les 65 kg par arbre.

Santé

- Peu sensible aux punaises
- Sensible à l'oïdium



Avocat de saison, variété Hall, arbre entier ©IAC-B. Naré



Avocat de saison, variété Hall, feuilles ©IAC-B. Naré



Avocat de saison, variété Hall, fruits sur l'arbre ©IAC-B. Naré



Avocat de saison, variété Hall, fruit entier et en coupe ©IAC-B. Naré



Caractéristiques de la variété SIMPSON

Type

- Hybride Guatemala x Antilles
- Groupe B

Fruit

- Taille : moyen
- Poids : 400 à 500 g
- Forme : ovoïde
- Peau lisse et moyennement épaisse
- Couleur vert clair
- Chair : jaune foncé, onctueuse et goûteuse
- Teneur en huile : 10 à 14%
- Matière sèche : 17 à 24%

Plantation

- 6 x 8 m
- Tailler fréquemment pour maîtriser le volume de l'arbre

Saisonnalité

- Floraison (groupe B) : mi-juillet à fin septembre
- Récolte : Mai-Juin-Juillet
- S'éclaircit à maturité

Rendement et récolte

- Très élevé : **33 kg/arbre**
- Sensible à la manutention

Santé

- Très sensible aux punaises



Avocats de saison, variété Simpson, arbre entier ©IAC-B. Naré



Avocats de saison, variété Simpson, feuilles ©IAC-B. Naré



Avocats de saison, variété Simpson, fruit entier et en coupe ©IAC-B. Naré

Caractéristiques de la variété CHOQUETTE

Type

- Hybride Guatemala x Antilles
- Groupe A

Fruit

- Taille : gros
- Poids : 550 g à 1 kg
- Forme ovoïde, aplati sur un côté
- Le pédoncule s'insère obliquement
- Peau lisse et épaisse, légèrement rugueuse (lenticelles)

- Couleur vert luisant
- Chair, jaune foncé, onctueuse et goûteuse
- Teneur en huile : 13%
- Matière sèche : 14 à 18%

Plantation

- 7 x 9 m
- Tailler un an sur deux

Saisonnalité

- Floraison (groupe A) : Septembre
- Récolte : début mai à mi juillet
- Ne vire pas de couleur à maturité

Rendement et manutention

- Moyen : **33 kg par arbre**
- Réaction moyenne à la manutention

Santé

- Sensible aux punaises



Avocats de saison, variété Choquette, arbre entier ©IAC-B. Naré



Avocats de saison, variété Choquette, feuilles ©IAC-B. Naré



*Avocats de saison, variété Choquette,
fruit entier et en coupe ©IAC-B. Naré*



Auteurs

Publié le : 6 août 2021

Auteurs du contenu scientifique et technique :

- Stéphane Lebégin (IAC)

Adaptation et rédaction web de la fiche Agripédia :

- Christina Do (IAC)
- Estelle Bonnet-Vidal (Lincks)

Relecture et validation finale : Stéphane Lebégin

Citation bibliographique recommandée :

Agripédia. Fiche technique "**Avocat : les variétés de saison**"
[En ligne] <https://www.agripedia.nc/ressources-vegetales/plantes-alimentaires/fruits/avocats/avocat-les-varietes-de-saison> (consulté le jour/mois/année)

Voir également [FAQ "Comment citer cette référence bibliographique ?"](#)