



Avocat : les variétés précoces

Persea americana

- Plantes alimentaires
- Fruits
- Avocats

Les variétés précoces produisent des fruits de janvier à avril. Trois variétés présentent des qualités économiques et agronomiques intéressantes pour anticiper la haute saison des avocats.



Identité

Nom scientifique
Persea americana

Noms Kanak
--

Famille
Lauraceae

Autres noms communs
--

Statut Biogéographique
Plante exotique

Origine géographique
Amérique centrale

Distribution géographique
Nouvelle-Calédonie

Description



Type de plante
Arbre

Durée de vie
Pluriannuelle



Feuillage
Persistant

Hauteur à maturité
Plus de 5 m



Type de fruit alimentaire
Fruit à noyau

Largeur à maturité
Entre 2 et 5 m



Couleur du fruit
Vert

Système racinaire
Développé

Conduite culturale

Multiplication
Greffage



Pollinisation
**Autopollinisation,
Par les insectes**

Où planter ?
Pleine terre



Croissance
Lente

Type de sol
Sol drainant



Entretien / Soins
Modéré

Densité
240 plants/Ha



Exposition au soleil
Mi-ombre

Productivité
20 kg/arbre



Besoin en eau
● ● ● ● ●



Résistance à la sécheresse
● ● ● ● ●

Santé



Résistance aux ravageurs
● ● ● ● ●



Résistance aux maladies
● ● ● ● ●

Principaux ravageurs
**Mouche des fruits,
Punaïses**

Principales maladies
Phytophthora

Usage & vertus

Alimentation
Produit frais

Vertus
**Vitamines, Magnésium,
Acides gras insaturés**

Autre usage
Huiles alimentaires

Saisonnalité

Floraison

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Fruits

Taille



Stéphane LEBÉGIN
Institut agronomique néo-calédonien (IAC)
01/07/2020
<http://www.iac.nc>





Généralités

Cette fiche présente les variétés les plus recommandées pour produire des avocats en début d'année (avant la saison), des variétés d'avocats dites précoces.

D'autres fiches présentent de façon plus détaillées des informations sur l'avocatier et sa culture :

Fiche : [Avocat](#)

Fiche : [Avocat : les variétés tardives](#)

Fiche : [Installez votre verger d'avocats](#)

Fiches : Les ravageurs de l'avocatier

Les variétés précoces

Les deux variétés précoces **les plus recommandées** pour leurs qualités agronomiques et économiques :

- **Pernod**
- **Tahiti 15**



Avocats, deux variétés précoces ©IAC

Saisonnalité

Floraison

- De **juin à septembre**, selon les variétés.

Récolte

- De **janvier à avril**
- Pic de production : **février**.

Production locale

Les quantités produites et commercialisées en Nouvelle-Calédonie sont présentées dans le tableau ci-dessous.

xxx

Caractéristiques de la variété PERNOD

Type

- Avocat des Antilles
- **Groupe A**

Fruit

- Taille : moyen à gros
- Poids : de **250 à 350 g**
- Forme de poire avec un apex asymétrique
- Peau lisse et fine
- Couleur : vert brillant à la récolte, violet/noir à maturité
- Chair : aqueuse mais peu d'arôme
- Teneur en huile : moins de 8%
- Matière sèche : 12 à 15%

Plantation

- 6 x 8 m
- Nécessite un écimage annuel

Saisonnalité

- Floraison (groupe A) : juin à septembre
- Récolte : **janvier à février**
- Vire partiellement au **violet-noir à la maturité**

Rendement et manutention

- Rendement faible : **20 kg par arbre**.
- Sensible à la manutention

Santé

- Sensible à la mouche des fruits

- Sensible également à la **punaise de l'avocat**



Avocat précoce, variété Pernod, arbre entier ©IAC - B. Naré



Avocat précoce, variété Pernod, feuilles ©IAC - B. Naré



Avocat précoce, variété Pernod, fruit sur arbre ©IAC - B. Naré



Avocat précoce, variété Pernod, fruit entier et en coupe ©IAC - B. Naré

Caractéristiques de la variété TAHITI 15

Type

- Avocats des Antilles
- Groupe B

Fruit

- Taille : gros
- Poids : de **600 à 800 g**
- Forme étroitement ovale
- Peau lisse et brillante
- Couleur : vert devenant violette à maturité
- Chair : jaune foncé, elle est onctueuse et goûteuse
- Teneur en huile : 8 à 10%
- Matière sèche : 15 à 18%

Plantation

- 7 x 9 m
- Nécessite un écimage annuel
- Nécessite une protection contre les coups de soleil

Saisonnalité

- Floraison (groupe B) : août à septembre
- Récolte : **février à avril**
- Vire au **violet à maturité**

Rendement et manutention

- Rendement faible : 16 kg par arbre.
- Sensible à la manutention

Santé

- Moyennement sensible aux punaises
- Peu d'externalisation des cicatrices



Avocat précoce, variété Tahiti 15, arbre entier ©IAC - B. Naré



Avocat précoce, variété Tahiti 15, feuilles ©IAC - B. Naré



Avocat précoce, variété Tahiti 15, fruit entier et en coupe ©IAC - B. Naré



Auteurs

Publié le : 6 août 2021

Auteurs du contenu scientifique et technique :

- Stéphane Lebégin (IAC)

Adaptation et rédaction web de la fiche Agripédia :

- Estelle Bonnet-Vidal (Lincks)
- Christina Do (IAC)

Relecture et validation finale : Stéphane Lebégin

Citation bibliographique recommandée :

Agripédia. Fiche technique "**Avocat : les variétés précoces**"
[En ligne] <https://www.agripedia.nc/ressources-vegetales/plantes-alimentaires/fruits/avocats/avocat-les-varietes-precoces> (consulté le jour/mois/année)

Voir également [**FAQ "Comment citer cette référence bibliographique ?"**](#)