



Avocat : les variétés tardives

Persea americana

- Plantes alimentaires
 - Fruits
 - Avocats

Les variétés de fin de saison et les variétés tardives produisent des fruits de juin à novembre. Trois variétés présentent des qualités économiques et agronomiques intéressantes pour prolonger la production des avocats après la haute saison.



Identité

Nom scientifique
Persea americana

Noms Kanak
--

Famille
Lauraceae

Autres noms communs
--

Statut Biogéographique
Plante exotique

Origine géographique
Amérique centrale

Distribution géographique
Nouvelle-Calédonie

Description

 Type de plante
Arbre

Durée de vie
Pluriannuelle

 Feuillage
Persistant

Hauteur à maturité
Plus de 5 m

 Type de fruit alimentaire
Fruit à noyau

Largeur à maturité
Entre 2 et 5 m

 Couleur du fruit
Vert

Système racinaire
Développé

Conduite culturale

Multiplication
Greffage

 Pollinisation
**Autopollinisation,
Par les insectes**

Où planter ?
Pleine terre

 Croissance
Lente

Type de sol
Sol drainant

 Entretien / Soins
Modéré

Densité
240 plants/Ha

 Exposition au soleil
Mi-ombre

Productivité
60 kg/arbre

 Besoin en eau


 Résistance à la sécheresse


Santé

 Résistance aux ravageurs


 Résistance aux maladies


Principaux ravageurs
Punaise

Principales maladies
Oïdium, Phytophthora

Usage & vertus

Alimentation
Produit frais

Vertus
**Vitamines,
Acides gras insaturés,
Magnésium**

Autre usage
Huiles alimentaires

Saisonnalité

Floraison	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Fruits	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Taille	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



Généralités

Cette fiche présente les variétés tardives, afin de produire des avocats après le pic de saison (d'avril à juin) et ainsi étaler la production quasiment toute l'année.

D'autres fiches présentent de façon plus détaillées des informations relatives aux avocats :

Fiche : [Avocat](#)

Fiche : [Les variétés précoces](#)

Fiche : [Installez votre verger d'avocats](#)

Fiche : [Les ravageurs de l'avocatier](#)

Les variétés tardives

Les trois variétés tardives **les plus recommandées** pour leurs qualités agronomiques et économiques :

- **Nishikawa**
- **Anaheim**
- **Reed**



Avocats, trois variétés tardives ©IAC

Saisonnalité

Floraison

- De **septembre à novembre**, selon les variétés.

Récolte

- De **juin à novembre**
- Pic de production : **septembre et octobre**.

Production locale

Les quantités produites et commercialisées en Nouvelle-Calédonie sont présentées dans le tableau ci-dessous.

à compléter

Caractéristiques de la variété NISHIKAWA

Type

- Variété du Guatemala
- **Groupe B**

Fruit

- Taille : moyen à gros
- Poids : de **300 à 500 g**
- Forme allongée, presque ovale
- Pédoncule épais, périanthe présent sur le fruit
- Peau luisante
- Couleur : vert foncée devenant vert jaune à maturité (lenticelles jaunissent)
- Chair : couleur jaune foncé, onctueuse et très goûteuse
- Teneur en huile : 21 à 25%
- Matière sèche : 23 à 30%

Plantation

- 7 x 9 m
- Lors de la taille, relever les jupes et aérer la canopée

Saisonnalité

- Floraison : septembre
- Récolte : **mi-juin à mi-août**
- **Ne vire pas de couleur à maturité**

Rendement et manutention

- Rendement élevé : **100 kg par arbre**
- Réaction moyenne à la manutention

Santé

- Sensible à la **punaise de l'avocat** au stade nouaison
- Très sensible à l'antracnose



Avocat tardif, variété Nishikawa, arbre entier ©IAC - B. Naré



Avocat tardif, variété Nishikawa, feuilles ©IAC - B. Naré



Avocat tardif, variété Nishikawa, fruits sur arbre ©IAC - B. Naré



Avocat tardif, variété Nishikawa, fruit entier et en coupe ©IAC - B. Naré

Caractéristiques de la variété ANAHEIM

Type

- Variété du Guatemala
- **Groupe A**

Fruit

- Taille : gros
- Poids : de **350 à 510 g**
- Forme elliptique ou ovoïde
- Peau moyennement rugueuse et moyennement épaisse
- Couleur : vert-brun et brillant
- Chair : pâle et tendre
- Teneur en huile : 15 à 22%
- Matière sèche : 21 à 25%

Plantation

- 6 x 8 m
- Tailler pour maîtriser le volume de l'arbre, fréquence selon le besoin

Saisonnalité

- Floraison : septembre à novembre
- Récolte : **mi-juillet à mi-novembre**
- Période de récolte varie selon les années
- **Ne vire pas de couleur à maturité**

Rendement et manutention

- Rendement élevé : **54 kg par arbre.**
- Manutention facile

Santé

- Sensible à la **punaise de l'avocat** au stade nouaison




Avocat tardif, variété Anaheim, arbre entier ©IAC - B. Naré



Avocat tardif, variété Anaheim, feuilles ©IAC - B. Naré



Avocat tardif, variété Anaheim, fruit sur l'arbre ©IAC - B. Naré



Avocat tardif, variété Anaheim, fruit entier et en coupe ©IAC - B. Naré

Caractéristiques de la variété REED

Type

- Variété du Guatemala
- **Groupe A**

Fruit

- Taille : moyen
- Poids : de **250 à 400 g**
- Forme ronde à ovale
- Peau lisse et brillante d'une épaisseur moyenne
- Couleur : vert foncé
- Chair : ferme, jaune, aqueuse développant une saveur noisette et un goût crémeux
- Teneur en huile : 14 à 16%
- Matière sèche : 25 à 32%

Plantation

- 6 x 8 m
- Écimer régulièrement. Les fleurs et fruits en nouaison sont présents au moment de la taille.

Saisonnalité

- Floraison : septembre à mi-novembre
- Récolte : **mi-août à mi-novembre**
- Certains fruits ont **tendance à jaunir très légèrement à maturité.**

Rendement et manutention



- Rendement élevé : **62 kg par arbre.**
- Manutention facile

Santé

- Sensible à la **punaise de l'avocat** au stade nouaison



Avocat tardif, variété Reed, arbre entier
©IAC - B. Naré



Avocat tardif, variété Reed, feuilles ©IAC -
B. Naré



Avocat tardif, variété Reed, fruit sur arbre
©IAC - B. Naré



Avocat tardif, variété Reed, fruit entier et en coupe ©IAC - B. Naré



Auteurs

Publié le : 6 août 2021

Auteurs du contenu scientifique et technique :

- Stéphane Lebégin (IAC)

Adaptation et rédaction web de la fiche Agripédia :

- Christina Do (IAC)
- Estelle Bonnet-Vidal (Lincks)

Relecture et validation finale : Stéphane Lebégin

Citation bibliographique recommandée :

Agripédia. Fiche technique "**Avocat : les variétés tardives**"
[En ligne] <https://www.agripedia.nc/ressources-vegetales/plantes-alimentaires/fruits/avocats/avocat-les-varietes-tardives> (consulté le jour/mois/année)

Voir également [FAQ "Comment citer cette référence bibliographique ?"](#)