



Bulbul à ventre rouge

- Productions végétales
- Santé du végétal

Le bulbul à ventre rouge *Pycnonotus cafer* est un oiseau exotique envahissant qui cause d'importants dégâts aux cultures.



Description

Le bulbul à ventre rouge est un passereau sombre d'environ 20 cm de longueur. Il est facilement reconnaissable à sa **crête noire** sur le dessus de la tête et ses **plumes sous caudales de couleur rouge vif**. Il a le **corps brun foncé** avec des motifs plus clairs rappelant la forme d'écailles. La tête est plus foncée voire noire, la **croupe est blanche** et les **rectrices sont noires** avec des tâches blanches aux extrémités.

Les adultes mâles et femelles sont identiques (pas de dimorphisme sexuel). Les jeunes individus immatures ont un plumage plus clair.

Distribution géographique

Originaire d'Asie du Sud-Est, son aire native s'étend d'Inde au Sri Lanka, jusqu'en Birmanie et au sud-ouest de la Chine. Il a été introduit dans de nombreuses îles du Pacifique (Fidji, Hawaii, Nouvelle-Calédonie, Samoa et Tonga), et s'est installé dans certaines régions de Dubaï (Watling 1978).

Il a été éradiqué à son arrivée en Nouvelle-Zélande, et ne semble pas s'être maintenu en Australie.

En Nouvelle-Calédonie, le bulbul à ventre rouge a été introduit dans les années 1980, comme oiseau d'ornement. Il a été observé en liberté à Nouméa dès 1983. Depuis, son aire de distribution ne cesse de s'agrandir. En 2008, le bulbul était présent de Tontouta au Nord, à la rive nord de la Rivière des Pirogues au Sud. En 2012, il s'était étendu un peu plus au Nord à Tomo et s'étirait au Sud à l'entrée de la Rivière Bleue. En 2014 son aire de répartition s'étendait de Boulouparis au col de Ngo.



Estelle VIDAL
Lincks
05/01/2021
<https://www.lincks.nc/>

